

Règles aux mouvements des bovins FCO 3 4 8 - MHE

Au 09/12/24

Mouvements de zone régulée vers zone indemne en France		
FCO 8	Bovin de tout âge	Pas de contraintes
MHE	Bovin de tout âge	Désinsectisation pendant au moins 14j. ET Analyse PCR négative réalisée au moins 14j après le début de désinsectisation.
FCO 3	Bovin de tout âge	Désinsectisation pendant au moins 14j. ET Analyse PCR négative réalisée au moins 14j après le début de désinsectisation.
Mouvements vers l'Espagne		
FCO	Bovins ≤ 90j	Veaux issus de mères vaccinées contre les sérotypes 3,4 et 8. Les mères doivent avoir reçu la 2 ^{ème} injection de primovaccination depuis au moins 3 semaines au moment de la naissance du veau. OU Analyse PCR négative de l'animal à vendre.*
	Bovins > 90j	Animaux vaccinés contre les sérotypes 3,4 et 8. Export possible 10j après la 2 ^{ème} injection de primovaccination FCO3.
MHE	Bovin de tout âge	Animaux ne présentant pas de signes cliniques.
Mouvements vers l'Italie		
FCO	Bovins ≤ 90j	Veaux issus de mères vaccinées contre les sérotypes 3,4 (selon région) et 8. Les mères doivent avoir reçu la 2 ^{ème} injection de primovaccination depuis au moins 3 semaines au moment de la naissance du veau. OU Analyse PCR négative de l'animal à vendre.
	Bovins > 90j	Animaux vaccinés contre les sérotypes 3,4 et 8. Export possible 10j après la 2 ^{ème} injection de primovaccination FCO3. OU Analyse PCR négative de l'animal à vendre.*
MHE	Bovin de tout âge situé en Zone Régulée MHE	Animal vacciné contre la MHE. Export possible 21j après la 2 ^{ème} injection de primovaccination MHE. OU Analyse PCR négative de l'animal à vendre.*
	Bovin de tout âge situé en Zone Indemne MHE	Animaux ne présentant pas de signes cliniques.

***ATTENTION** : Possible fin de reconnaissance des PCR pour l'export en 2025

Vaccins utilisables en France						SPECIFICATIONS RCP DES VACCINS				
Maladie	Laboratoire fabricant	Nom du vaccin	Laboratoire distributeur en France	Accès du vaccin	Espèce(s) visée(s)	Primo-vaccination Sous-cutanée (SC) Intramusculaire (IM)	Age mini	Délai installation immunité complète après primovaccination	Durée d'immunité	Usage
FCO	Boehringer-Ingelheim	BTV Pur 4 et 8	Boehringer-Ingelheim	Vétérinaire et PSE	Bovin Ovin Autre ¹	2 inj à 3-4 sem (1ml SC)	2,5 mois	3 sem	12 mois	Protection sanitaire Mouvement
	SYVA ²	Syvazul 4 et 8 ²	Inovet	Vétérinaire et PSE	Ovin ² Bovin Autre ¹	1 seule inj (2ml SC) 2 inj à 3 sem (4ml IM)	3 mois	39 jours 21 jours	12 mois	Protection sanitaire Mouvement
	CZV	Bluevac 8	Melchior	Vétérinaire et PSE	Bovin Ovin Autre ¹	2 inj à 3-4 sem (4ml SC) 2 inj à 3 sem (2ml SC)	2 mois 2,5 mois	31 jours 21 jours	12 mois	Protection sanitaire Mouvement
	Boehringer-Ingelheim	Bultavo 3	Boehringer-Ingelheim	Vétérinaire uniquement (ATU)	Bovin Ovin	2 inj à 3 sem (1ml IM) 1 seule inj (1 ml SC)	2,5 mois 3 mois	3 sem	Non déterminé	Protection sanitaire Mouvement ³ : Bovin uniquement ⁴
	CZV	Bluevac 3	Melchior	Vétérinaire uniquement (ATU)	Bovin ³ Ovin ³	2 inj à 3-4 sem (4ml SC) 2 inj à 3 sem (2ml SC)	2 mois	3 sem	Non déterminé	Protection sanitaire ⁵
MHE	CEVA	Hepizovac	CEVA	Vétérinaire uniquement (ATU)	Bovin	2 inj à 3 sem (4ml SC)	2 mois	3 sem	Non déterminé	Protection sanitaire Mouvement ³

ATTENTION : pour les exports, les animaux peuvent être exportés 10 jours après leur(s) rappel(s) FCO, mais 21 jours après le rappel MHE. (dérogation spécifique avec certains pays uniquement sur la FCO même si le délai d'immunité est de 21 jours)

¹-Utilisable pour d'autres espèces dans le cadre de la cascade (protocole à adapter par le vétérinaire)

²-Pratique pour les ovins car une seule injection

³-L'utilisation possible du vaccin dans le cadre des mouvements dépend du pays destinataire

⁴-Certains pays acceptent des mouvements avec ce vaccin pour les ovins pour certaines de leurs zones

⁵-Certains pays acceptent des mouvements avec ce vaccin pour les ovins et les bovins pour certaines de leurs zones